

ELEMENTOS CLAVE

SOBRE EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO



El cáncer cervicouterino, cáncer de cuello uterino o cáncer de cérvix, es uno de los tipos de cáncer con mayor incidencia y mortalidad entre las mujeres en América Latina y el Caribe.

El cáncer cervicouterino tarda de 10 a 15 años en desarrollarse y es uno de los más prevenibles.

Cuida tu salud y el bienestar de tu familia



Hazte un control ginecológico una vez al año

INFÓRMATE



TODO SOBRE EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO



FACTORES DE RIESGO:

El principal factor de riesgo es la infección por el virus del papiloma humano (VPH).

PREVENCIÓN:

El cáncer de cuello uterino se puede prevenir con la vacuna contra el VPH (prevención primaria) y con pruebas de tamizaje o detección temprana (prevención secundaria).

TAMIZAJE:

Las pruebas de tamizaje o detección temprana para el cáncer de cuello uterino pueden descubrir lesiones precancerosas o cambios celulares en el cérvix que se pueden tratar eficazmente. La prueba del VPH puede detectar si hay o no infección por el virus del papiloma humano.

TRATAMIENTO:

El cáncer de cuello uterino se puede tratar y es altamente curable cuando se detecta y trata en etapas tempranas. Todas las mujeres corren riesgo de contraer cáncer de cuello uterino y aunque muchos factores de riesgo se pueden evitar, es recomendable hacerse pruebas de tamizaje periódicamente. Y ya que en etapas tempranas el cáncer cervicouterino no presenta síntomas, las pruebas de tamizaje son importantes para una detección temprana cuando el cáncer se puede tratar.

IMPACTO:

Según datos oficiales del Ministerio de Salud el cáncer de cuello uterino es la principal causa de enfermedad y muerte en mujeres en edad fértil en Bolivia; nuestro país tiene la tasa más elevada de cáncer de cuello uterino de América y del mundo.

